

ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА

Вирусная инфекция, протекающая в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными болями, болями в мышцах и суставах, сыпью; в тяжелых случаях – с развитием менингита, менингоэнцефалита, паралича




Основные переносчики заболевания – комары

Заболевание не передается от человека к человеку!



Заболеть можно только от укуса комара!



- 1 головная боль
- 2 ларингит
- 3 боли в суставах
- 4 распухшие лимфоузлы
- 5 боли в желудке
- 6 диарея
- 7 мышечная слабость

Инкубационный период между укусом комара и появлением первых симптомов колеблется от 3 до 14 дней

Если после укуса комара у вас появилась клиника данного заболевания, необходимо срочно обратиться к врачу!


Раннее начало лечения приводит к более благоприятному течению заболевания и способствует быстрому выздоровлению!

ПРОФИЛАКТИКА ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА

При выезде на природу использовать одежду, защищающую от укусов, и репеллентные средства, разрешенные к применению на территории РФ



В период с начала мая до конца сентября устанавливать на окна противомоскитные сетки



Не менее 1 раза в неделю менять воду в емкостях для ее хранения не дачах и в частном секторе, тем самым не допуская размножения комаров



